

FO-HOSP-08  
Versión: 0  
Fecha: 06/11/2020  
Páginas: 1 de 4

Especialistas  
**Cuando  
se trata  
de ti**



EDUCACIÓN PARA  
EL EGRESO  
DEL PACIENTE  
PORTADOR DE BOTÓN DE  
**GASTROSTOMÍA**



 ClinicaSanLuisBga

 @ClinicaSanLuis

 @ClinicaSanLuisBucaramanga

## ¿QUÉ ES UN BOTÓN DE GASTROSTOMÍA?

Un botón gástrico es una sonda de silicona transparente que se coloca a través de la piel del abdomen hasta el estómago. Sirve para alimentar al paciente, darle la medicación y descomprimir el estómago.

## CUIDADOS DEL ESTOMA Y BOTÓN

- Limpiar diariamente la zona alrededor del botón con agua tibia y jabón. Secar cuidadosamente la zona alrededor del botón con un copito de algodón.
- Dar una vuelta entera al botón 1 vez al día, evitar halar el botón.
- Se recomienda verificar el volumen de agua del balón cada 8 días, máximo cada 15 días con la misma cantidad de agua que le dejó el cirujano.
- Limpiar las extensiones cada día con agua tibia.



## ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO Y ALIMENTO

- Lavar la sonda con agua, antes y después de administrar la medicación.
- Las pastillas o tabletas pueden administrarse si se trituran hasta obtener un polvo fino, disuelto en 5 o 10 ml de agua.
- No mezclar varios medicamentos en la misma jeringa.



- Se recomienda que en el momento de la alimentación el paciente este semisentado (mínimo 45°), siendo conveniente mantener esta posición durante una hora después de la comida.
- Conectar la extensión al botón, haciendo coincidir la raya negra de la extensión con la raya negra del botón y girar la extensión una vuelta.
- Antes y después de cada comida o medicamento pasar 10 -15 cc de agua hervida a temperatura ambiente para lavar la extensión.



## RECOMENDACIONES

- Si el botón se ha salido con el balón inflado, vaciar el balón, introducir el botón por la estoma y volver a inflar el balón con la misma cantidad de agua. Es indispensable un previo lavado de manos o técnica de limpieza.
- Tener en cuenta si hubo lesión de la piel o el estoma está muy dilatado, recuerde que por ahí se puede fugar alimento o jugo gástrico que cause irritación o infección en la piel del paciente. Debe consultar con un profesional.
- Si el balón se ha roto, volver a introducir el botón por el estoma, sujetándolo con gasa y un esparadrapo. Acudir a la clínica sin superar las 4 horas del evento.
- No intentar pasar alimento vía oral sin que sea ordenado.
- El paciente debe cepillarse los dientes y la lengua con crema de dientes 2 veces al día como mínimo. (No tragársela). En pacientes que no colaboren, debe estar inclinado hacia adelante durante la limpieza de la boca. No utilizar crema de dientes.

**Para mayor información comunícate con nosotros y resuelve tus dudas. Teléfono 6430026 ext 1605 plan de egreso y educación al usuario.**

Especialistas  
**Cuando  
se trata  
de ti**

